



# NOUVELLES ESPÈCES D'OPHIDIENS D'ASIE ET D'AMÉRIQUE

FAISANT PARTIE DE LA

COLLECTION DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE

PAR LE

**Dr M. G. PERACCA**

Assistant au Museum de Zoologie de l'Université de Turin.

Les espèces nouvelles décrites dans cette note font partie de la collection herpétologique du Museum d'Histoire naturelle de Genève dont M. le professeur M. BEDOT a bien voulu me confier l'étude.

## **Liparophis n. gen.**

Dents maxillaires au nombre de 18 en série continue à peu près d'égale longueur, sauf la dernière qui est légèrement plus courte; dents mandibulaires de même longueur d'avant en arrière. Tête de moyenne grosseur, légèrement convexe transversalement, non distincte du cou. Œil de moyenne grandeur, à pupille subovale verticale: narine s'ouvrant dans une nasale allongée dont le bord inférieur est divisé; préfrontale unique; une frénale et une préoculaire. Corps légèrement comprimé;

écailles avec deux fossettes apicales, lisses, sauf sur la région sacrale où elles sont faiblement carénées et sur la queue où les carènes sont plus prononcées, en 19 séries; queue de moyenne longueur, urostèges en double série. Vertèbres dorsales postérieures pourvues d'hypapophyses.

Ce nouveau genre est très proche du genre *Tapinophis* Blgr.

*Liparophis Bedoti* n. sp.

Rostrale près de deux fois plus large que haute, à bord supérieur convexe, visible d'en haut; nasales allongées dont le bord inférieur est divisé, séparées par deux internasales presque triangulaires très rétrécies en avant; préfrontale unique, près de deux fois plus large que haute; frontale pentagonale, légèrement plus longue que large, dépassant légèrement en longueur la distance qui la sépare de l'extrémité du museau, considérablement plus courte que les pariétales. Superculaires allongées, assez étroites. Frénale aussi haute que longue, rétrécie en haut; une préoculaire en contact avec la préfrontale; 3 postoculaires à droite et 2 à gauche; 1-2 temporales; 9 supérolabiales, la cinquième touchant à l'œil; sousmaxillaires antérieures en contact avec 5 inférolabiales et plus courtes que les postérieures qui sont séparées sur la ligne médiane par une écaille. Écailles en 19 séries avec deux fossettes apicales, allongées, luisantes, lisses sauf sur la région sacrale où elles sont faiblement carénées et sur la queue où les carènes sont plus prononcées; 196 gastrostèges arrondies sur les côtés; anale divisée; 55 urostèges doubles.

La coloration fondamentale est d'un gris noisette sur le dessus du corps, plus ou moins lavé de jaune sur la tête; la gorge, le ventre et le dessous de la queue sont jaunâtres. On remarque, à partir de la nuque, une série d'anneaux noirs, pour la plupart complets, et qui entourent le corps. Ces anneaux,

très étroits sur le ventre où ils occupent la largeur moyenne de deux gastrostèges, atteignent graduellement, sur le dos, leur plus grande largeur en couvrant environ 4 écailles. Chacun de ces anneaux présente dans son milieu une bande transversale étroite d'un jaunâtre plus ou moins clair qui descend, dans l'anneau noir, sur les côtés du corps, jusqu'à la deuxième série d'écailles. Quelques-uns de ces anneaux sont un peu irréguliers par le fait qu'ils sont comme coupés longitudinalement sur la ligne médiane du ventre et leurs bouts déplacés de façon à se trouver l'un au devant de l'autre, tout en restant généralement en contact entre eux. Une disposition semblable s'observe aussi, quoique dans une proportion moindre, sur la ligne médiane du dos. Sur le dessus de la tête, on remarque quelques taches noires à contours indécis sur le bout du museau; la frontale, les superoculaires et les pariétales sont noires; sur ces dernières, on remarque 2 petites taches uniformes jaunâtres se faisant vis-à-vis le long de la suture interpariétale; une bande noire, amincie sur les côtés, suit immédiatement les pariétales et se termine sur la lèvre inférieure en contournant d'arrière en avant l'angle de la bouche; une tache noire verticale, qui descend sur la huitième labiale, se trouve entre l'œil et la bande noire qui suit les pariétales; les sutures entre les labiales supérieures sont noires; on remarque enfin, sur la gorge, une tache noire en  $\perp$  dont la branche antérieure s'insinue entre les deux plaques sousmaxillaires postérieures.

Un seul sujet, femelle, mesurant 717<sup>mm</sup> de longueur, dont 104<sup>mm</sup> pour la queue, provenant de la Chine, sans indication de localité plus précise.

*Trachischium læve* n. sp.

Dents maxillaires au nombre de 17 en série continue, dont les postérieures sont légèrement plus courtes. Dents mandibulaires

de même longueur d'avant en arrière. Vertèbres dorsales pourvues d'hypapophyses.

Rostrale plus haute que large, bien visible d'en haut ; la suture entre les internasales est très courte, égalant à peu près en longueur la moitié de la longueur de la suture entre les préfrontales ; frontale hexagonale dépassant légèrement en longueur la distance qui la sépare de l'extrémité du museau, plus courte que les pariétales ; frénale plus longue que haute (réunie à gauche avec la préoculaire chez la femelle) ; 1 préoculaire et 1 postoculaire ; 1 + 1 temporales ; 5 supérolabiales dont la troisième et la quatrième touchent à l'œil et la cinquième est la plus longue : sousmaxillaires antérieures en contact avec 4 inférolabiales et légèrement plus longues que les postérieures, qui sont en contact chez la femelle et largement séparées par une écaille chez le mâle.

Écailles en 13 séries à peu près aussi larges que longues dans la partie moyenne du corps, très lisses partout, luisantes, sans fossettes apicales, sans trace de carène sur la région sacrale chez le mâle ; 147 gastrostèges chez le mâle, 149 chez la femelle ; anale divisée ; 39 urostèges chez le mâle, 33 chez la femelle. Queue de moyenne longueur à bout très pointu.

Les parties supérieures sont d'un brun plus ou moins grisâtre presque uniforme. La tête est sans taches et les écailles du corps observées à un très faible grossissement paraissent cerclées d'un bord sombre, leur centre étant finement pointillé de jaunâtre. La gorge, le ventre et le dessous de la queue sont jaunâtres de même que la première rangée d'écailles.

Deux sujets, un mâle et une femelle. Longueur du mâle : corps 337<sup>mm</sup> ; queue 53<sup>mm</sup> ; longueur de la femelle : corps 502<sup>mm</sup> ; queue 70<sup>mm</sup>.

L'étiquette ne porte pas d'autre indication que « Indes orientales ».

*Oxyrhopus bicolor* n. sp.

Tête à bords latéraux sub-parallèles, très légèrement aplatie en dessus; museau arrondi ne débordant que très peu sur la lèvre inférieure. Œil moyen dont le diamètre transversal est contenu environ deux fois et un tiers dans la distance qui sépare l'œil de l'extrémité du museau. Rostrale beaucoup plus large que haute, rétrécie en haut et se terminant par un angle arrondi dont la portion visible d'en haut égale environ le cinquième de la distance qui sépare la rostrale de la frontale; internasales assez petites, rétrécies en avant, dont la suture égale à peu près les deux tiers de la longueur de la suture entre les préfrontales; frontale un peu plus longue que large en forme de pentagone allongé, égalant en longueur la distance qui sépare la frontale de la rostrale, plus courte que les pariétales; frénale allongée, environ une fois et demie plus longue que haute; 1 préoculaire assez petite, largement séparée de la frontale, n'atteignant pas la surface supérieure de la tête: 2 postoculaires: 2 + 3 temporales; 8 supérolabiales dont la quatrième et la cinquième touchent à l'œil; sousmaxillaires antérieures en contact à droite avec 5 et à gauche avec 6 inférolabiales et considérablement plus longues que les postérieures.

Ecailles en 19 séries à peu près aussi larges que longues dans la partie moyenne du corps, lisses, avec 2 fossettes apicales; 157 gastrostèges; anale divisée; 70 urostèges doubles.

La coloration du dessus de la tête et du corps est d'un brun violacé assez sombre et sans taches sur les 8 à 9 rangées médianes d'écailles. La lèvre supérieure, la gorge, le ventre et le dessous de la queue sont jaunâtres; les flancs sont d'un brun jaunâtre clair qui se confond graduellement avec la teinte brune du dos.

Un seul sujet, mâle, mesurant 657<sup>mm</sup> de longueur dont 150<sup>mm</sup> pour la queue.

Nord de Santa-Fé, Argentine.

Cette espèce appartient au groupe de *O. Clalia* Daud. et *Oxyrhopus maculatus* Blgr. dont elle s'éloigne, de même que des autres espèces du genre, par le nombre bien moindre des gastrostèges, par la rostrale qui s'étend très peu en arrière sur la surface de la tête et par le corps encore plus élancé que chez *O. Clalia*, quoique plus lourd que chez *O. petolarius* L.

---